

HDAE ÉCHELLE D'ÉVALUATION DE L'APHASIE

Exploration détaillée et analytique des troubles du langage acquis

POPULATION : ADOLESCENTS / ADULTES

Le Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE), test d'aphasie mis au point en 1972 par Goodglass et Kaplan est, dans ce domaine, le plus utilisé dans le monde. Il explore les fonctions linguistiques de façon systématique et quantitative, permet de comparer des aphasiques entre eux et de juger avec précision leur évolution et les progrès réalisés en cours de leur rééducation.

Ce test se compose de trente subtests à la méthodologie rigoureuse : deux analyses de variance successives et une analyse des coefficients de corrélation ont été effectuées sur les notes de 40 aphasiques pour établir la cotation quantitative, le classement et l'appariement de ces subtests. Utilisée dans sa forme complète, cette échelle fournit un état très précis des capacités linguistiques du patient.

RÉFÉRENCE ÉDITORIALES

GOODGLASS H., E.KAPLAN. française J.M.
MAZEAUX ET J.M. ORGOGOZO, ECPA, 1972
Adaptation

RATIONNEL

Dépistage des syndromes aphasiques et définir leur type clinique dans un but diagnostique

ADMINISTRATION

- Passation : individuelle
- Temps de passation: de 45 à 60 mn
- Temps de correction : 30mn

MATÉRIEL

- Manuel
- 21 planches
- 25 feuilles de réponses